

Inspirationskatalog
til butikken

Gl. Sunds Planteskole
v/Ole Søndergaard
www.lyngplanter.dk

Hedeperler®



Specialiteter

Specielle og spændende små surbundsplanter til lyngbedet o.a.



Andromeda polifolia 'Blue Ice'
Rosmarinlyng



Rosa hvide blomster maj - juni. Blågråt løv.



Andromeda polifolia 'Blue Lagoon'
Rosmarinlyng



Rosa hvide blomster maj - juni. Blågrønt løv.



Andromeda polifolia 'Nikko'
Rosmarinlyng



Store lys pink farvede blomster i maj - juni. Grønt løv.



Arctostaphylos Uva-ursi 'Vancouver Jade'
Melbærris



Krybende, stedsegrøn stærkt forgrenet busk. Klokkeformede lys rosa blomster i små klaser i april-maj. Planter i fuld sol. En god bunddækkende plante, til sandjord og surbund, med lyserøde bær fra midt sommer og til hen på efteråret.



Arctostaphylos Uva-ursi 'Massachusetts'
Melbærris



Krybende, stedsegrøn stærkt forgrenet busk. Klokkeformede lys rosa blomster i små klaser i april-maj. Planter i fuld sol. En god bunddækkende plante, til sandjord og surbund, med lyserøde bær fra midt sommer og til hen på efteråret.



Asarum europaeum
Alm. hasselurt

Stedsegrønne mørkegrønne blade - stor dækkeevne. Små brunrøde blomster i maj gemt under bladene. Planter i humusholdig fugtig, men veldrænede jord. Langsomtvoksende. Placeres i halvskygge eller skygge. 10 cm.

Specialiteter

Cassiope. "Kantlyng" er alle lave, stedsegrønne surbundsplanter med tynde og spinkle skud, der dækkes af tætsiddende, nærmest taglagte, små spidse blade, der ligger helt tæt op ad selve grenen. God trivsel forudsætter en lys placering i sur, fugtighedsbevarende, men perfekt drænet jord. De tåler ikke kraftig udtørring. Væksten varierer fra let oprette former til nærmest tæppedannende typer. Et mindre antal af de ca. 15 arter og en del af hybriderne kan uden større vanskeligheder dyrkes i Danmark.



Cassiope hybr. 'Cross Branklyn'
Kantlyng



Denne vokser lidt kraftigere end sorten 'Edinburgh', men ellers ligner disse hinanden med hvide, klokkeformede blomster i forårstiden.



Cassiope hybr. 'Edinburgh'
Kantlyng



En hybrid mellem to forskellige Cassiope arter. Denne sort er en opret voksende, stedsegrøn dværgbusk, som kan blive op til 30 - 40 cm. høj. Den er én af de nemmeste og mest hårdføre i gruppen af cassiope-hybrider.



Cassiope hybr. 'Medusa'
Kantlyng



Klokkeformede hvide blomster med let rosa skær på kanten af blomsten i maj. Ca. 20 cm. Brunligt vinterløv.



Cassiope lycopodioides
Kantlyng



Denne art forekommer i adskillige former og varianter over et stort udbredelsesområde på den nordlige halvkugle. Det er lave, stedsegrønne surbundsplanter, der har smukke, hvidlige blomster i forårstiden. Alle skud er tynde og trådagtige.



Cassiope lycopodioides 'Beatrice Lilley'
Kantlyng




Hvide klokkeformede blomster i maj. Krybende vækst.

Specialiteter




Cornus canadensis **Canadisk hønsebær**

Hvide "blomster" maj – juni. Selve blomsten, der er ganske lille med mørke støvdragere, omgives af store, hvide bægerblade. Røde bær der dog sjældent sættes i større mængder. God bunddækkende skovbundsplante til områder i lys skygge, f. eks. mellem større rododendron.



Empetrum nigrum 'Bernstein' **Revling**

Hunlig klon med gulligt sommerløv, der efterår og vinter skifter til orange og bronze-agtige farver. Flad, krybende vækst. Fundet på øen Sild.



Empetrum nigrum 'Irland' **Revling**

Grønt løv det meste af året.
Mere kompakt end den sædvanlige form. Krybende vækst.



Empetrum nigrum **Vild revling**

Lav bunddækkende plante med grønt stedsegrønt løv. Sorte spiselige frugter fra juli - september. Planter i fuld sol i veldrænet sur til neutral jord. Klippes moderat efter behov. 10 cm.



Specialiteter



Gaultheria miqueliana



Bjergte

Små, hvide blomster i maj. Senere op til 10 mm store, snehvide, dekorative bær. Stedsegrøn med blanke, skinnende blade, der i vintertiden ofte får et rødligt skær. Breder sig ved udløbere. Ca. 15 cm. høj. Stammer fra Japan.



Gaultheria procumbens



Bjergte

5 – 8 mm lange, hvide, klokkeformede blomster i maj – juni. Senere 5 – 10 mm store, skinnende, klare røde bær. Mørkegrønne, læderagtige, skinnende blade. Nyvæksten ofte kobberfarvet. Breder sig langsomt ved udløbere. Ca. 10 cm. høj. Hårdfør bunddække-plante fra Nordamerika.



Kalmia polifolia 'Newfoundland'



Smalbladet kalmia

Stedsegrøn dværgbusk med smalle, let indrullede blade, ca. 40 x 40 cm. Rosa/lys purpur blomster i maj. Meget blomsterrig.



Linnaea borealis

Stedsegrøn dværgplante med helt flad, krybende vækst. Hvidlige til svagt rosa klokkeformede blomster i maj – juni. Planter i lys skygge og skovbundsagtig jord.



Specialiteter



Pieris japonica 'Little Heath Green'

Lille, stedsegrøn surbundsplante, der stort set aldrig blomstrer, men nyvæksten viser en flot symfoni af forskellige nuancer af rødt.



Pieris japonica 'Little Heath'



Lille, stedsegrøn surbundsplante med hvide blomster i april/maj og hvidbroget løv. Nyvæksten er lys bronze farvet.



Rhododendron camtschaticum, lilla form ***Kamtjatka rhododendron***

Løvfældende dværg-rhododendron, med lilla blomster fra maj og spredt hen over sommeren. Ca. 25-30 cm. Planter i sol eller meget lys skygge.



Rhododendron camtschaticum, rød form ***Kamtjatka rhododendron***

Løvfældende dværg-rhododendron, der i modsætning til den almindelige form har røde blomster fra maj og spredt hen over sommeren. Ca. 25-30 cm. Planter i sol eller meget lys skygge.



Rhododendron, 'VASON' ***Japansk Azalea***



Storblomstrende, mørk rosa, meget robust stedsegrøn azalea med mange vinterblade. Lav, tæt vækst. Planter i surbund på solrig placering. Maj - Juni. Ca. 30 cm.



Specialiteter

X phylliopsis er alle krydsninger mellem en phyllodoce-art og kalmiopsis leachiana. De er stedsegrønne, opret voksende surbundsplanter med talrige blomster i maj – juni. Ca. 40 x 40 cm. Planter i veldrænet surbund på solrig plads.



X phylliopsis 'Askival'



Mørke karminrosa blomster i maj - juni.
Ca. 40 høj og bred.



X phylliopsis 'Mermaid'



Lys rosa til næsten hvide blomster i maj - juni.
Ca. 40 høj og bred.



X phylliopsis 'Pinocchio'



Mørke karminrosa blomster i maj - juni.
Ca. 40 høj og bred.



X phylliopsis 'Sprite'



Lys til mørk lilla blomster i maj - juni.
Ca. 40 høj og bred.



Vaccinium macrocarpon 'Big Pearl'



Vaccinium vitis-idaea 'Koralle'

Specialiteter

*Rubus x stellarcticus. Allåkerbær. Disse har alle karminrosa blomster i maj – juni.
Bærsætning kræver plantning af mindst 2 forskellige sorter.
Plantes på solrig plads i fugtig, men veldrænet jord.
Sorterne stammer fra bevidst krydsning af rubus arcticus med rubus stellatus.*



Rubus x stellarcticus 'Anna'
Allåkerbær



Lyse rødlige, syrlige bær med let smag.
Ca. 30 cm.



Rubus x stellarcticus 'Beata'
Allåkerbær



Røde, velmagende bær midsommer.
Ca. 30 cm.



Rubus x stellarcticus 'Linda'
Allåkerbær



Mørkerøde bær med kraftig smag.
Ca. 30 cm.



Rubus x stellarcticus 'Sofia'
Allåkerbær



Røde, velmagende bær midsommer.
Ca. 30 cm.



Specialiteter



Vaccinium hirsutum

Sort blåbær



Selvbestøvende løvfældende, opret voksende, 50 - 60 cm høj blåbær art fra det sydøstlige Nordamerika. Blomstrer i maj - juni med hvidlige blomster med rosa strøg. Mange spiselige, sort-røde til sorte bær i store klaser.



Vaccinium macrocarpon 'Bergman'

Storfrugtet tranebær



Højtydende tranebærsort med pæreformede, mellemstore og velsmagende bær, der modner midt i børsæsonen.



Vaccinium macrocarpon 'Big Pearl'

Storfrugtet tranebær



Hurtigt voksende og rigt bærende sort med store spiselige bær i sensommeren. God til bunddække i de lyse dele af surbundsbedet.



Vaccinium macrocarpon 'Stevens'

Storfrugtet tranebær



Meget store, mørkerøde, runde til ovale bær, der er lidt flade i begge ender. Modner i midten af børsæsonen. God holdbarhed. Nem at dyrke og den trives også godt på jorde med lavt indhold af organisk materiale.



Vaccinium myrtillus

Almindelig dansk blåbær



Grønlig-hvide til rødlige blomster i maj. Store, spiselige, velsmagende bær i sensommeren. Planter i lys skygge og surbund. Ca. 35 cm.



Vaccinium oxycoccus

Vild tranebær

Krybende plante med grønne aflange små stedsegrønne blade. Rosarøde blomster i det tidlige forår og spiselige små tranebær fra august - september. Planter i fugtigholdende jord med lav pH. Fuldt hårdfør. 5 cm.

Specialiteter



Vaccinium vitis-idaea 'Erntekrone'
Tyttebær



Stedsegrøn kompakt voksende sort med mørkegrønt løv, og lysende røde bær i sensommeren. Ca 20 cm.



Vaccinium vitis-idaea 'Koralle'
Tyttebær



Stedsegrøn. Mere moderat voksende form, der i mindre grad end den almindelige vilde form breder sig ved underjordiske udløbere. Aflange, omvendt ægformede blade. Ud over forårsblomstringen har den også ofte en mere beskedne blomstring i august – september. Rigelig bærsætning. Ca. 25 cm.



Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl'
Tyttebær




Stedsegrøn. Form med kraftig vækst og større, mere afrundede blade. Ca. 35 cm. Breder sig hurtigt ved udløbere. Bær er op til 12 mm store.



Vaccinium vitis-idaea var. minus
Tyttebær



Dværgform. Stedsegrøn. Varieteten er en alpin form af den almindelige tyttebær, og i kultur findes flere forskellige kloner, som alle er smukke dværgplanter, der sjældent bliver højere end 5 cm. Nogle er flinke til at blomstre og sætte bær, andre er mere beskedne i så henseende.



Vaccinium uliginosum
Mosebølle



Gullighvide blomster i maj/juni på flotte blåliggrønne blade. Blåsorte bær sidst på sommeren.



Vaccinium myrtillus



Vaccinium uliginosum

Græsser i 1 liter potter



Carex morrowii 'Ice Dance'

Hvidstribet japansk star

Oplivende hvidstribet stargræs, som beholder løvet om vinteren. Spredt sig langsomt med rhizomer. Gerne fugtig jord. Planter i sol eller halvskygge. Aks er brune. 30 cm, aks 40 cm.



Festuca gautieri 'Elijah Blue'

Blå bjørnegræs

Tæt tue med mange stive oprette bladaks i opsigtsvækkende farve. Er vintergrøn, men mister noget af farven. Stålblå bladaks. 25 cm.



Imperata cylindrica 'Red Baron'

Japansk blodgræs

Tuedannende græs med dekorative røde bladspidser, der bliver tydeligst i efteråret. Sent udspring. Planter i staudebedet, græsbedet eller i krukker. Ca 30 cm.



Leymus arenarius 'Blue Dune'

Marehalm

Opretvoksende stivbladet græs, der er særdeles tørketålende. Strandengsgræs. Passer godt til krukker. Placeres i fuld sol og kræver veldrænet jord. juni-juli. 50 cm, aks 100 cm



Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Lampepudsergræs

Tuedannende smalbladet græs med overhængende blade og oprette blomsteraks, der hæver sig over tuen. Anvendes som bunddække, i grupper og i krukker. Placeres i fuld sol. Juli - oktober. 40 cm, aks 60 cm.



Pennisetum orientale 'Karley Rose'

Lampepudsergræs

Dekoratitv smalbladet græs med overhængende blade og store rosa blomsteraks. Blomstring fra juli - oktober. Bladene får gule høstfarver. 60 - 80 cm.

Græsser i 1 liter potter



Pennisetum orientale 'Tall Tails'

Lampepudsergræs

Dekoratív smalbladet græs med overhængende blade og store hvide blomsteraks. Blomstring fra juli - oktober. Bladene får gule høstfarver. ca. 80 cm.



Pennisetum alopecuroides 'Red Head'

Lampepudsergræs

Tuedannende smalbladet græs med overhængende blade og oprette blomsteraks, der hæver sig over tuen. Rødbrun. 40 cm, aks 60 cm.



Sesleria autumnalis

Efterårsblåaks

Smuk ukompliceret tuedannende græs. Rimelig tørketolerant. Starter sent, men fra sommeren dannes de lyse blomster over de limegrønne blade. Aks er lyse. 30 cm, aks 50 cm



Sesleria heufleriana

Blåaks

Fin forårsgræs med dekorative sorte blomsteraks. Solid bunddækkende græs med opret vækst. Rimelig tørketolerant. Aks er sorte. 30 cm, aks 50 cm.



Bregner i 1 liter potter



Asplenium scolopendrium

Hjortetunge

Vintergrøn bregne med smalle let bølgede blade. Sporehuse sidder bag på bladene i fiskebensmønster. Vildtvoksende i Danmark. Stensætninger, nordvendte bede. Humusrig fugtig, men veldrænet jord. Placeres i halvskygge og skygge. 40 cm.



Athyrium filix-femina

Alm. fjerbregne

Skovbundsregne med fjersnitdelte blade. Vokser i fugtig, næringsrig og humusrig jord og trives godt i surbundsbedet. Placeres i både sol og skygge. 80 cm.



Athyrium niponicum 'Pewter Lace'

Nipponfjerbregne

Skovbundsregne med fjersnitdelte blade, der har sølvagtige tegninger og mørke bladstilke. Vokser i fugtig, næringsrig og humusrig jord og trives godt i surbundsbedet. Placeres i både sol og skygge. 50 cm.



Blechnum penna-marina

Krybende kambregne

Krybende bregne med brede snitdelte mørkegrønne og vintergrønne blade. Vokser i fugtig, næringsrig og humusrig jord og trives godt i surbundsbedet. Placeres i halvskygge og skygge. 15 cm.



Bregner i 1 liter potter



Blechnum spicant

Alm. kambregne

3-4 cm brede enkelt snitdelte mørkegrønne og vintergrønne blade. Næsten vandret vækst. Vokser i fugtig, næringsrig og humusrig jord og trives godt i surbundsbedet. Placeres i halvskygge og skygge. 30 cm.



Dryopteris affinis

Guldskaelmangeløv

Vaseformet bregne med læderagtige blade, hvor midterribberne er dækket af gyldne skæl. Robust og god bunddækkende plante. Vokser i fugtig og humusholdig jord, men tåler nogen tørke. Placeres i sol og skygge. 100 cm.



Dryopteris erythrosora

Rødslørmangeløv

Tidlige blade er først kobberrøde, senere bronzefarvede og skifter til grønne. Vintergrønt løv. Robust og god bunddækkende plante. Vokser i fugtig og humusholdig jord, og tåler nogen tørke. Placeres i sol og skygge. 60 cm.



Dryopteris filix-mas 'Lin. Polydactyla'

Alm. mangeløv

Vaseformet bregne med dobbelt fjerdelte mørkegrønne og delvist vintergrønne blade. Robust og god bunddækkende plante. Vokser i fugtig og humusholdig jord, og tåler nogen tørke. Placeres i sol og skygge. 80 cm.



Matteuccia struthiopteris

Alm. strudsvinge

Tragtformet bregne, der breder sig med udløbere. Grønne blade og rødbrune høstfarver. Humusholdig, fugtig, men veldrænet jord. God bunddække, men kræver plads. Placeres i sol og skygge. 100 cm.



Polypodium vulgare

Alm. engelsød

Læderagtige vintergrønne blade. Krybende bregne med brune udløbere. Næringsrig, humusholdig og veldrænet jord. En god bunddækkende plante. Placeres i sol eller halvskygge. 30 cm.

Bregner i 1 liter potter



Polystichum polyblepharum ***Østasiatisk skjoldbregne***

Tragtformet bregne med stive oprette blade, hvor ribberne er dækket med små hår. Vintergrønne blade. Næringsrig, humusholdig og veldrænet jord. Smuk bregne i bedet og i krukker.



Polystichum setiferum 'Herrenhausen' ***Kirkegårdsbregne***

Tuedannende bregne med vintergrønne blade. Dobbelt fjersnitdelte blade med brun bladribbe. Tørketålende. Anvendes under træer og i sur jord. Næringsrig, humusrig veldrænet jord. Placeres i halvskygge og skygge. 60 cm.



Polystichum setiferum 'Proliferum' ***Mosbregne***

Tuedannende bregne med vintergrønne blade og brun bladribbe. Findelte blade giver et mosset udseende. Tørketålende. God skovbunds bregne under træer og buske. Næringsrig, humusholdig veldrænet jord. Placeres i halvskygge og skygge. 40 cm.



Trædebregner



Leptinella dioica syn. 'Reptans'

Trædebregne

Lav bunddækkende vintergrøn staude med små ubetydelige gulgrønne blomster fra juli - august. God i fugtig og humusrig jord. Tåler nogen færdsel. Placeres i sol og halvskygge. 5 cm.



Leptinella dioica 'Minima'

Trædebregne

Meget lav bunddækkende vintergrøn staude med små ubetydelige gulgrønne blomster fra juli - august. Egner sig også i fuger mellem sten. Tåler nogen færdsel. Placeres i sol eller halvskygge. 3 cm.



Leptinella potentillina

Trædebregne

Fin bunddækkende vintergrøn staude med grågrønne blade og små ubetydelige gulgrønne blomster fra juli - august. God i fugtig og humusrig jord. Tåler nogen færdsel. Placeres i sol eller halvskygge. 5 cm.



Leptinella squalida

Trædebregne

Fin bunddækkende vintergrøn staude med brungrønne blade og små ubetydelige gulgrønne blomster fra juli - august. God i fugtig og humusrig jord. Tåler nogen færdsel. Placeres i sol eller halvskygge. 5 cm.



Leptinella squalida 'Platt's Black'

Trædebregne

Fin bunddækkende vintergrøn staude med mørke blade og små ubetydelige gulgrønne blomster fra juli - august. God i fugtig og humusrig jord. Tåler nogen færdsel. Placeres i sol eller halvskygge. 5 cm.



Daboecia, irsk lyng



Daboecia cantabrica 'Alba'
Irsk lyng



Hvide, klokkeformede blomster juni – oktober.
Mørkegrønt, skinnende løv. Ca. 40 x 70 cm.



Daboecia cantabrica 'Angelina'
Irsk lyng



Røde klokkeformede blomster juli – oktober.
Opret vækst. Ca. 25 cm.



Daboecia cantabrica 'Vanessa'
Irsk lyng



Store, violette blomster juli – oktober.
Ca. 30 – 50 cm.



Erica / Forår



Erica carnea 'Cornelia'
Forårslyng



Lysende røde blomster i april - maj, opret vækst, mørkt løv.
Ca. 15-20 cm.



Erica carnea 'Eva'
Forårslyng



Karminrøde blomster februar – april. Mørkegrønt løv.
Ca. 20 cm.



Erica carnea 'Golden Starlet'
Forårslyng



Hvide blomster december – marts. Gylden-gult sommerløv.
Om vinteren er løvet nærmest limegrønt. Ca. 25 x 40 cm.
Afstamning: 'Snow Queen' x 'Foxhollow'. K. Kramer, Tyskland 1984. AGM 1992.



Erica carnea 'Isabell'
Forårslyng



Hvide blomster februar – april. Lys grønligt løv. Ca. 15 x 35 cm.
Afstamning: 'Snow Queen' x 'Springwood White'. K. Kramer, Tyskland 1982.



Erica carnea 'Rosalie'
Forårslyng



Lys til mørkere rosa blomster januar – april. Mørkegrønt løv med bronzeagtigt skær.
Ca. 15 x 35 cm. Afstamning: 'Myretoun Ruby' x ? K. Kramer, Tyskland, 1981.



Erica / Forår



Erica carnea 'Samantha'

Forårslyng



Rosa/laksefarvede blomster fra februar - april. Særdeles attraktiv for bier. Lang blomstringstid. Grønligt stedsegrønt løv. Planter i fuld sol i veldrænet jord med lav til neutral pH. Klippes moderat efter blomstring. Ca. 25 cm.



Erica carnea 'Steffi'

Forårslyng



Hvide blomster i marts - april. Særdeles attraktiv for bier. Alm. grønligt løv. Ca. 15-25 cm.



Erica carnea 'Tanja'

Forårslyng



Mørke karminrøde blomster marts – april. Mørk grønligt løv med bronzeagtigt skær. Ca. 15 cm.



Erica carnea 'Whisky'

Forårslyng



Mørkrosa blomster januar – maj. Lys whiskyfarvet løv. Ca. 15 x 40 cm. Frøplante fra 'Myretoun Ruby', K. Kramer 1984. Markedsført 1. gang af Denbeigh Heather Nurseries, England. (Synonym: 'Bell's Extra Special' efter navnet på et whiskymærke).



Erica carnea 'Winterfreude'

Forårslyng



Karminrøde blomster december – april. Grønligt løv. Ca. 15 x 40 cm. Afstamning: 'Myretoun Ruby' x ? K. Kramer 1981.



Erica carnea 'Wintersonne'

Forårslyng



Violetrosa til magentarøde blomster februar – maj. Rødbrunligt løv. Ca. 15 x 35 cm. Afstamning: 'Myretoun Ruby' x ? K. Kramer, Tyskland 1984.

Erica / Forår



Erica x darleyensis 'Kramer's Rote'
Forårslyng



Magentarøde blomster januar – april.
Mørkegrønt løv med brunligt skær. Ca. 35 x 60 cm.



Erica x darleyensis 'Rubina'®
Forårslyng



Rubinrosa blomster januar - maj.
Mørkegrønt løv.



Erica x darleyensis 'Snow Surprise'®
Forårslyng



Lysende, helt snehvide blomster marts – maj.
Lysegrønt løv. Opret vækst.



Erica x darleyensis 'Spring Surprise'®
Forårslyng



Violetrosa blomster marts – maj. Mørkegrønt løv. Opret vækst, ca. 30 cm.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.



Erica aborea 'Albert's Gold'
Trælyng



Små hvide duftende blomster i februar - marts. Lysende gule stedsegrønne blade.
Plantes i veldrænet jord med lav pH. Placeres i fuld sol eller halvskygge. 60-80 cm.



Erica cinerea 'Alba Major'
Grålyng



Hvide blomster juli – november. Grønligt løv. Ca. 30 x 55 cm.
God gammel sort der har været dyrket siden 1870.

Erica / Forår



Erica cinerea 'Dave'
Grålyng



Mørkelilla blomster juli - september.



Erica cinerea 'Tobi'
Grålyng



Røde blomster juli - september.



Erica x stuartii 'Irish Orange'
Klokkeling



Store violetrosa blomster juni – september. Grønt løv med orange skudspidser i forårstiden. Ca. 25 x 45 cm. Fundet i Irland i 1965.



Erica tetralix 'Alba'
Klokkeling



Hvide blomster juni – oktober.
Grågrønt, dunet løv. Opret vækst, ca. 25 x 35 cm.



Erica tetralix 'Con Underwood'
Klokkeling



Magentarøde blomster juli – oktober. Grågrønt løv. Ca 25 x 35 cm.
Fundet i Surrey, England af Mrs. Con Underwood i 1938.
Markedsført siden 1948. AGM 1992.



Calluna vulgaris / Efterårslyng



Calluna vulgaris 'Angie'®
Efterårslyng

Knopblomstrende. Mørkerøde knopper, september - december. Opret vækst, ca. 30 cm. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.



Calluna vulgaris 'Annemarie'
Efterårslyng

Store fyldte rosa blomster på meget lange blomsterstande september – oktober. Kraftig vækst, ca. 50 cm. Sort fra 'Peter Sparkes'. K. Kramer 1973. AGM 1992.



Calluna vulgaris 'Aphrodite'®
Efterårslyng

Knopblomstrende. Rubinrøde knopper, september - november. Ca. 35 cm. Sort fundet på 'Amethyst', 1998. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.



Calluna vulgaris 'Athene'®
Efterårslyng

Knopblomstrende. Mørkerøde knopper, august - december. Mørkegrønt løv. Ca. 30 cm. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.



Calluna vulgaris 'Beoley Silver'
Efterårslyng



Flot, hvid enkelt blomst med lysebrune støvdragere september – oktober. Sølvgråligt dunet løv. Opret vækst, ca. 35 cm.



Calluna vulgaris 'Bonita'®
Efterårslyng

Knopblomstrende. Rødviolet september – oktober. Gult sommerløv, der efterår og vinter skifter til bronze. Ca. 30 cm. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris / Efterårslyng



Calluna vulgaris 'Coco'

Efterårslyng

Hvide blomster fra september - oktober. Lang blomstringstid. Stedsegrøn med opret kompakt vækst. Planter i fuld sol i veldrænet jord med lav pH. Klippes tilbage efter blomstring. Ca 30 cm.



Calluna vulgaris 'Con Brio'



Efterårslyng

Rubinrøde blomster august – september. Orange-gult løv, der skifter til rødlige og bronze nuancer om vinteren. Ca. 35 x 45 cm. Sort fra 'Allegro', fundet i Holland 1981.



Calluna vulgaris 'County Wicklow'

Efterårslyng

Store fyldte laksrosa blomster på lange, meget dekorative stande august – oktober. Lav, udbredt vækst, ca. 25 x 40 cm. Fundet i naturen i County Wicklow, Irland 1933.



Calluna vulgaris 'Danny'

Efterårslyng

Dybt røde blomster fra september-oktober. Lang blomstringstid. Stedsegrøn med opret vækst. Planter i fuld sol i veldrænet jord med lav pH. Klippes tilbage efter blomstring. Ca 40 cm.



Calluna vulgaris / Efterårslyng



Calluna vulgaris 'Dark Beauty'®
Efterårslyng

Lyse rubinrøde blomster august – oktober. Kompakt, opret vækst, ca. 30 cm. Opstået som sort på 'Darkness' efter røntgenbestråling, 1986, Holland. Til dato vel nok den flotteste røde Calluna. Vandt guldmedalje Boskoop 1990.



Calluna vulgaris 'Darkness'
Efterårslyng



Karminrøde blomster august – oktober. Mørkegrønt løv. Tæt opret vækst, ca. 25 x 35 cm. England omkr. 1966. AGM 1992.



Calluna vulgaris 'Easter-Bonfire'
Efterårslyng



Lyse purpur blomster august – september. Lyst grønligt løv. I forårstiden meget dekorative creme og rødligt farvede skudspidser. Opret vækst, ca. 40 x 50 cm. Holland omkr. 1976.



Calluna vulgaris 'Elisa'
Efterårslyng

Hvide blomster i september-oktober. Lys grønligt løv. Kompakt vækstform. God som snitblomst, ca. 30 cm.



Calluna vulgaris 'Franca'
Efterårslyng

Knopblomstrende med mørke rosa blomster i september-oktober. Holder blomsterne længe. Opret vækst. God som snitblomst, ca. 35 cm.



Calluna vulgaris 'Firefly'
Efterårslyng



Rødviolette blomster august – september. Nyvækst og sommerløv lys til mørk orangegul. Vinterløvet rødligt. Opret vækst, ca. 45 – 50 cm. England omkr. 1977.

Calluna vulgaris / Efterårslyng



Calluna vulgaris 'Freya'
Efterårslyng

Knopblomstrende lyng med rosapink knopper i august til oktober. Ca 30 cm.



Calluna vulgaris 'Golden Angie'®
Efterårslyng

Knopblomstrende. Røde knopper september – december, med gul løv året rundt.



Calluna vulgaris 'Heidesinfonie'
Efterårslyng



Purpurrosa blomster august – oktober. Mørkegrønt løv, der får et bronzeagtigt skær om vinteren. H. Hatje, Tyskland 1982.



Calluna vulgaris 'Helena'®
Efterårslyng

Knopblomstrende. Snehvide knopper i september – december. Opret vækst. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.



Calluna vulgaris 'Hilda'®
Efterårslyng

Knopblomstrende lyng med violette knopper i september – november. Kompakt vækst. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.



Calluna vulgaris 'Irma'
Efterårslyng

Rosarøde blomster fra september - oktober. Lang blomstringstid. Stedsegrøn med opret kompakt vækst. Planter i fuld sol i veldrænet jord med lav pH. Klippes tilbage efter blomstring. Ca 30 cm.

Calluna vulgaris / Efterårslyng



Calluna vulgaris 'Jana'
Efterårslyng

Store fyldte mørkrosa blomster i september – oktober.
Ca. 25 cm.



Calluna vulgaris 'Jysk Naturform'
Efterårslyng



Lyse rødviolette blomster august – september. Mørkegrønt løv, der farves svagt brunligt i vintertiden. Ca. 35 x 45 cm.

Fundet og selekteret af Ole Søndergaard på jysk hedeareal i 1996 – bl.a. med det formål at bevare en repræsentant for den typiske hedelyng.



Calluna vulgaris 'Kerstin'
Efterårslyng



Rødviolette blomster august – september. Gråligt løv med smukke gule og røde skudspidser i forårstiden. Ca. 40 x 50 cm.

Selekteret af Brita Johansson, Sverige i 1983 og opkaldt efter hendes datter.



Calluna vulgaris 'Kinlochruel'
Efterårslyng

Store fyldte rent hvide blomster i store mængder august – september. Grønligt løv, der får et bronzeagtigt skær om vinteren. Mere bred end høj, ca. 25 x 45 cm.
Sort fra 'County Wicklow', fundet i Skotland i 1969. FCC 1982, AGM 1992.



Calluna vulgaris 'Kongenshus'
Efterårslyng



Naturform fra Kongenshus Hede med lysvioletrøde blomster i august - september.
Tæt vækst. Ca. 35 cm.



Calluna vulgaris 'Lena'®
Efterårslyng

Knopblomstrende. Lys rosa/pink knopper august – oktober.
Bred opret vækst, ca. 40 cm.

Calluna vulgaris / Efterårslyng



Calluna vulgaris 'Low White'
Efterårslyng



Hvide blomster august – oktober. Grønt løv med svagt blåligt skær. Lav, flad vækst, ca. 10 x 30 cm. Efter vores erfaringer én af de bedste krybende sorter.



Calluna vulgaris 'Madonna'
Efterårslyng

Knopblomstrende lyng med meget store knopper i september-december. Bred opret vækst. ca. 30 cm.



Calluna vulgaris 'Marlies'
Efterårslyng

Knopblomstrende. Magentarøde knopper september – december. Mørkegrønt løv. Ca. 30 x 50 cm. Sort fundet på 'Marleen' i 1991, Tyskland.



Calluna vulgaris 'Martina'
Efterårslyng

Knopblomstrende lyng med varme mørkerøde knopper i september-november. Kompakt vækst. Ca. 30 cm.



Calluna vulgaris / Efterårslyng



Calluna vulgaris 'Nico'
Efterårslyng



Purpurrøde enkle blomster i august-september. Mørkegrønt løv og opret vækst. August - september. Ca. 30 cm.



Calluna vulgaris 'Patricia'
Efterårslyng

Røde blomster. Blomstring i september-oktober. Holder blomsterne længe. Opret vækst. God som snitblomst, ca. 30 cm.



Calluna vulgaris 'Radnor'
Efterårslyng

Laksrosa fyldte blomster i august - oktober. Rigt blomstrende, fremragende sort. ca. 25 cm.



Calluna vulgaris 'Red Favorit'
Efterårslyng

Fyldte karminrøde blomster august - september. Lav bred vækst. Mørkegrønt løv med bronzefarvet skær om vinteren.



Calluna vulgaris 'Reinweisse Lena'
Efterårslyng

Hvide blomster i september-oktober. Tidlig blomstring. Lys grønligt løv. Opret vækst. God som snitblomst, ca. 30 cm.



Calluna vulgaris 'Sandy'®
Efterårslyng

Knopblomstrende. Helt hvide knopper august – november. Gulligt løv året rundt. Ca. 35 x 45 cm. Sort fra 'Melanie', fundet af Marohn & Häger, Tyskland i 1995. Én af de få gultløvede, knopblomstrende lyng. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris / Efterårslyng



Calluna vulgaris 'Silvana'
Efterårslyng

Knopblomstrende lyng med lysviolette knopper i september - november.
Smukt gråt løv.



Calluna vulgaris 'Silver Knight'
Efterårslyng




Lilla blomster august – september. Sølvgråligt fint dunet løv.
Opret vækst, ca. 40 x 50 cm. Fundet af J. W. Sparkes, England omkr. 1966.



Calluna vulgaris 'Sister Anne'
Efterårslyng



Lyse rødviolette blomster august – oktober. Grågrønt løv, der får et mørkt, bronzeagtigt skær om vinteren. Lav, bred vækst, ca. 10 x 25 cm.
Fundet i naturen i Cornwall af Miss Anne Moseley omkr. 1929.



Calluna vulgaris 'Stephanie'
Efterårslyng



Hvide blomster september – november. Lys grønligt løv. Ca. 25 x 35 cm.
Afstamning: 'Hammondii' x 'Long White'. K. Kramer, Tyskland 1992.



Calluna vulgaris / Efterårslyng



Calluna vulgaris 'Wickwar Flame'
Efterårslyng



Lys rødviolette blomster august – september.
Gulligt løv i sommertiden, senere gylden til bronze, om vinteren bronze til rødt farvet løv. Ca. 50 x 60 cm. Fundet af G. Osmund, Wickwar, England i 1970.



Calluna vulgaris 'Zalina'
Efterårslyng

Knopblomstrende lyng med små blomster i september-oktober.
Mørke - næsten sorte grene. Opret vækst. God kontrastplante, ca. 35 cm.



Calluna vulgaris 'Zelia'
Efterårslyng

En spændende kontrastplante helt uden blomster med grønt løv året rundt.
Ca 30 cm.



Calluna vulgaris 'Zeta'®
Efterårslyng

Spændende kontrastplante helt uden blomster. Lysende gult løv året rundt.
Ca. 30 cm.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.



Calluna vulgaris 'Zoe'®
Efterårslyng

Spændende kontrastplante helt uden blomster. Orange-gult sommerløv og intens bronze vinterløv. Ca. 30 cm.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.



Calluna vulgaris 'Zorina'
Efterårslyng

Spændende kontrastplante helt uden blomster. Orange-gult sommerløv og intens orange-rødt vinterløv. Opret vækst. Ca 30 cm.





Gl. Sunds Planteskole
Gl. Sundsvej 15
DK-7451 Sunds



Hedeperler®

Telefon 97 14 12 18
os@lyngplanter.dk
www.lyngplanter.dk